

貯法：室温保存

有効期間：3年

	OD錠25mg	OD錠50mg	OD錠75mg
承認番号	22700AMX00402000	22700AMX00403000	22700AMX00404000
販売開始	2015年6月	2015年6月	2015年6月

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 ナフトピジル口腔内崩壊錠

ナフトピジルOD錠25mg 「EE」

ナフトピジルOD錠50mg 「EE」

ナフトピジルOD錠75mg 「EE」

Naftopidil OD Tablets

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）










本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ナフトピジルOD錠 25mg 「EE」	ナフトピジルOD錠 50mg 「EE」	ナフトピジルOD錠 75mg 「EE」
有効成分	1錠中 ナフトピジル 25mg	1錠中 ナフトピジル 50mg	1錠中 ナフトピジル 75mg
添加剤	アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、クロス ポビドン、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステア リン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水 和物		

3.2 製剤の性状

販売名	ナフトピジルOD錠 25mg 「EE」	ナフトピジルOD錠 50mg 「EE」	ナフトピジルOD錠 75mg 「EE」	
剤形	割線入りの裸錠（口腔内崩壊錠）			
色調	白色			
外形	表面			
	裏面			
	側面			
直径 (mm)	約6.6	約8.6	約9.6	
厚さ (mm)	約2.8	約3.4	約4.0	
質量 (mg)	約100	約200	約300	
本体表示	ナフトピジルOD 25EE	ナフトピジルOD 50EE	ナフトピジルOD 75EE	

4. 効能又は効果

前立腺肥大症に伴う排尿障害

5. 効能又は効果に関連する注意

本剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意し、本剤投与により期待する効果が得られない場合には手術療法等、他の適切な処置を考慮すること。

6. 用法及び用量

通常、成人にはナフトピジルとして1日1回25mgより投与を始め、効果が不十分な場合は1～2週間の間隔をおいて50～75mgに漸増し、1日1回食後経口投与する。
なお、症状により適宜増減するが、1日最高投与量は75mgまでとする。

8. 重要な基本的注意

8.1 起立性低血圧があらわれることがあるので、体位変換による血圧変化に注意すること。

8.2 本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい、立ちくらみ等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

8.3 本剤投与開始時に降圧剤投与の有無について問診を行い、降圧剤が投与されている場合には血圧変化に注意し、血圧低下がみられたときには、減量又は中止するなど適切な処置を行うこと。
[10.2 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 重篤な心疾患のある患者

使用経験がない。

9.1.2 重篤な脳血管障害のある患者

使用経験がない。

9.3 肝機能障害患者

健康人に比し、最高血漿中濃度が約2倍、血漿中濃度曲線下面積が約4倍に増加したとの報告がある。

9.8 高齢者

低用量（例えば12.5mg/日等）から投与を開始するなど、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。本剤は、主として肝臓から排泄されるが、高齢者では肝機能が低下していることが多いため、排泄が遅延し、高い血中濃度が持続するおそれがある。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿剤 降圧剤 [8.3 参照]	降圧作用が増強するおそれがあるため、減量するなど注意すること。	本剤及び併用薬の降圧作用が互いに協力的に作用する。
ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤 シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物等	併用により、症候性低血圧があらわれるおそれがある。	これらは血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強するおそれがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害、黄疸（頻度不明）

AST、ALT、 γ -GTP等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.1.2 失神、意識喪失（頻度不明）

血圧低下に伴う一過性の意識喪失等があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1～1%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹	そう痒感、蕁麻疹	多形紅斑
精神神経系	めまい・ふらつき、頭痛・頭重	倦怠感、眠気、耳鳴、しびれ感、振戦、味覚異常	頭がボーッとする
循環器	立ちくらみ、低血圧	動悸、ほてり、不整脈（期外収縮、心房細動等）	頸脈
消化器	胃部不快感、下痢	便秘、口渇、嘔気、嘔吐、膨満感、腹痛	

	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓	AST、ALTの上昇	LDH、Al-Pの上昇	
血液			血小板数減少
眼		霧視	術中虹彩緊張低下症候群(IFIS)、色視症
その他		浮腫、尿失禁、悪寒、眼瞼浮腫、肩こり、鼻閉、勃起障害	女性化乳房、胸痛

注) 発現頻度は使用成績調査を含む

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

14.1.3 本剤は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 類似化合物(プラゾシン塩酸塩)で腎及びその他の動脈狭窄、脚部及びその他の動脈瘤等の血管障害のある高血圧患者で、急性熱性多発性関節炎がみられたとの報告がある。

15.1.2 α_1 遮断薬を服用中又は過去に服用経験のある患者において、 α_1 遮断作用によると考えられる術中虹彩緊張低下症候群(Intraoperative Floppy Iris Syndrome) があらわれるとの報告がある。

15.2 非臨床試験に基づく情報

動物実験(マウス)において、300mg/kg/日(臨床最大用量の約200倍)を2年間経口投与した場合、雌で乳腺腫瘍の発生頻度が対照群に比し有意に増加したとの報告がある。また、マウスに同用量を77週間経口投与した結果、血清プロラクチンが対照群に比し上昇したとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与・反復投与

健康成人にナフトビジル25、50及び100mg^(注)を空腹時に単回経口投与したとき、下記のデータが得られている。

	25mg	50mg	100mg ^(注)
Tmax (時間)	0.45±0.21	0.75±0.71	0.65±0.22
Cmax (ng/mL)	39.3±10.3	70.1±32.9	134.8±55.8
半減期 (時間)	15.2±4.7	10.3±4.1	20.1±13.7

(n=5、平均±標準偏差)

また、1回50mgを1日2回食後反復経口投与^(注)すると、血中濃度は4回目投与で定常状態に達した。


16.1.2 生物学的同等性試験

ナフトビジルOD錠75mg「EE」とフリバスOD錠75mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ錠(ナフトビジルとして75mg)健康成人男性に水あり及び水なしで絶食下単回経口投与して血漿中のナフトビジル濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁽²⁾。

薬物動態パラメータ(水あり)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ナフトビジルOD錠75mg「EE」	312.3±147.3	138.4±67.5	0.5±0.1	7.8±3.7
フリバスOD錠75mg	307.9±134.8	132.2±56.9	0.6±0.3	8.2±3.2


(1錠投与、Mean±S.D.、n=28)



薬物動態パラメータ(水なし)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ナフトビジルOD錠75mg「EE」	270.8±104.7	81.7±37.2	1.0±0.6	8.2±2.9
フリバスOD錠75mg	262.0±97.3	84.8±31.2	1.2±1.1	7.8±2.3

(1錠投与、Mean±S.D.、n=28)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人にナフトビジル50mgを空腹時及び食後に単回経口投与すると、最高血中未変化体濃度到達時間はそれぞれ0.75時間及び2.20時間であり、食後投与で遅延する傾向を示し、血中濃度-時間曲線下面積はわずかに増大したが、最高血中濃度及び消相の半減期に変化がなく、ナフトビジルの吸収に及ぼす食事の影響は少なかった⁽¹⁾。

16.3 分布

16.3.1 蛋白結合率

健康成人にナフトビジル100mg^(注)を空腹時単回経口投与したときの血清蛋白結合率は98.5%であった⁽³⁾。

16.4 代謝

主要代謝反応は、未変化体のグルクロン酸抱合及びメトキシフェニル基の水酸化であった⁽³⁾。

16.5 排泄

健康成人にナフトビジル25、50及び100mg^(注)を単回経口投与したときの投与後24時間までの尿中未変化体排泄率はいずれも0.01%以下であった⁽¹⁾。

16.6 その他

16.8.1 ナフトビジルOD錠25mg「EE」は、ナフトビジルOD錠75mg「EE」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた⁽⁴⁾。

16.8.2 ナフトビジルOD錠50mg「EE」は、ナフトビジルOD錠75mg「EE」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた⁽⁵⁾。

注) 本剤の承認された用法・用量は、「通常、成人にはナフトビジルとして1日1回25mgより投与を始め、効果が不十分な場合は1~2週間の間隔において50~75mgに漸増し、1日1回食後経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日最高投与量は75mgまでとする。」である。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内臨床試験

自覚症状、ウロダイナミクス検査(最大尿流率、平均尿流率等)において、用量依存性的かつ有意な改善が認められた。また、二重盲検比較試験の結果、1日1回投与において有用性が確認された。二重盲検比較試験を含む496例の臨床試験成績の改善率は以下のとおりである^{(6)~(12)}。

試験方法	改善率(「改善」以上)
一般臨床試験	58.5% (234/400)
二重盲検比較試験	71.9% (69/96)

さらに、長期投与例30例においても安定した有効性が認められた⁽⁹⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ナフトビジルは、アドレナリン α_1 受容体の選択的遮断薬。 α_1 受容体刺激作用に拮抗するが、尿道平滑筋の α_1 受容体遮断作用による尿道緊張緩和に基づく排尿困難改善作用が臨床的に利用される⁽¹³⁾。

18.2 ヒトでの作用

18.2.1 交感神経系 α 受容体に対する親和性

ヒト前立腺腺標本を用いた受容体結合実験で、 α_1 受容体への親和性を示した⁽¹⁴⁾。

18.2.2 前立腺に対する作用

α_1 受容体作動薬によるヒト摘出前立腺平滑筋の収縮を抑制した⁽¹⁰⁾。

18.2.3 排尿障害改善作用

前立腺肥大症に伴う排尿障害患者に対する臨床薬理試験において、最大尿道閉鎖圧及び最小尿道抵抗が有意に低下し、最大尿流率及び平均尿流率が有意に増加した⁽¹¹⁾。

18.3 動物での作用

18.3.1 前立腺、尿道及び膀胱三角部に対する作用

α_1 受容体作動薬によるウサギ摘出前立腺、尿道及び膀胱三角部平滑筋の収縮を抑制した⁽¹⁵⁾。

18.3.2 尿道内圧に対する作用

無麻酔雄ウサギにおいて、尿道内圧を用量依存的に低下させた⁽¹⁵⁾。麻酔雄イヌにおいては、 α_1 受容体作動薬による血圧上昇に対する抑制よりも、尿道内圧上昇を抑制的に抑制した⁽¹⁶⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: ナフトビジル (Naftopidil)

化学名: (2RS)-1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol

分子式: C₂₄H₂₈N₂O₃


分子量: 392.49

性状: 白色の結晶性の粉末である。

無水酢酸に極めて溶けやすく、N,N-ジメチルホルムアミド又は酢酸(100)に溶けやすく、メタノール又はエタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

光によって徐々に淡褐色となる。

N,N-ジメチルホルムアミド溶液 (1→10) は旋光性を示さない。
化学構造式：



及び鏡像異性体

融点：126～129℃

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。本剤は光により変色することがある。変色したものは使用しないこと。

22. 包装

〈ナフトビジルOD錠25mg【EE】〉

100錠 [10錠×10；PTP]

100錠 [プラスチックボトル；バラ；乾燥剤入り]

〈ナフトビジルOD錠50mg【EE】〉

100錠 [10錠×10；PTP]

100錠 [プラスチックボトル；バラ；乾燥剤入り]

〈ナフトビジルOD錠75mg【EE】〉

100錠 [10錠×10；PTP]

100錠 [プラスチックボトル；バラ；乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) 中島光好 他：臨床医薬. 1992；8 (Suppl.3)：11-29
- 2) 社内資料：生物学的同等性試験 (OD錠75mg)
- 3) 寺門敬夫 他：臨床医薬. 1992；8 (Suppl.3)：3-9
- 4) 社内資料：生物学的同等性試験 (OD錠25mg)
- 5) 社内資料：生物学的同等性試験 (OD錠50mg)
- 6) 深谷保男 他：西日本泌尿器科. 1992；54 (5)：697-710
- 7) 山口脩 他：基礎と臨床. 1997；31 (3)：1315-1360
- 8) 山口脩 他：臨床医薬. 1992；8 (3)：699-722
- 9) 山西友典 他：泌尿器外科. 1992；5 (4)：359-363
- 10) 山中直人 他：泌尿器科紀要. 1991；37：1759-1772
- 11) Yasuda K., et al.：Prostate. 1994；25：46-52
- 12) 平川真治 他：西日本泌尿器科. 1991；53 (4)：572-578
- 13) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店 2021；C3809-C3812
- 14) Yamada S., et al.：Life Sci. 1992；50 (2)：127-135
- 15) 森龍太郎 他：薬理と治療. 1992；20 (2)：375-381
- 16) Takei R., et al.：Jpn. J. Pharmacol. 1999；79：447-454

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
TEL (0120) 517-215
FAX (076) 442-8948

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **エルメット株式会社**
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

26.2 販売元

 **日医工株式会社**
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21