

貯法：室温保存

有効期間：3年

漢方製剤

承認番号 16100AMZ03835000

販売開始 1986年10月

N37

コタロー

半夏白朮天麻湯

はん げ びやく じゅつ てん ま とう

エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒
有効成分	本剤9.0g中 日局ハンゲ …… 3.0g 日局ショウキョウ …… 0.5g 日局ビャクジュツ …… 3.0g シンキク …… 2.0g 日局ソウジュツ …… 3.0g 日局オウギ …… 1.5g 日局チンピ …… 3.0g 日局ニンジン …… 1.5g 日局ブクリョウ …… 3.0g 日局タクシャ …… 1.5g 日局バクガ …… 2.0g 日局オウバク …… 1.0g 日局テンマ …… 2.0g 日局カンキョウ …… 1.0g 上記の混合生薬より抽出した水製乾燥エキス6.2gを含有する。
添加剤	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	黄土色～黄褐色
味	苦い
におい	特異なにおい
識別コード	N37

4. 効能又は効果

冷え症、アトニー体質で疲労しやすく、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。
胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。

6. 用法及び用量

通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、蕁麻疹等

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

20. 取扱い上の注意

- 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

- 500g [ポリ瓶、バラ]
- 3.0g×42包 [分包]
- 3.0g×168包 [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部
〒531-0071
大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140
(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号