

貯法：室温保存

有効期間：2年

承認番号 16100AMZ03837000

販売開始 1986年10月

漢方製剤

コタロー

N69

茯苓飲

ぶく りょう いん

エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	コタロー茯苓飲エキス細粒
有効成分	本剤6.0g中 日局ブクリョウ・・・5.0g 日局ショウキョウ・・・0.8g 日局ビャクジュツ・・・4.0g 日局チンピ・・・・・・3.0g 日局ニンジン・・・・・・3.0g 日局キジツ・・・・・・1.5g 上記の混合生薬より抽出した水製乾燥エキス3.8gを含有する。
添加剤	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ ン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	黄褐色～褐色
味	初め甘くのち辛い
におい	特異なにおい
識別コード	N69

4. 効能又は効果

胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があつて尿量減少するもの。

胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。

6. 用法及び用量

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、蕁麻疹等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ポリ瓶、バラ]

2.0g×42包 [分包]

2.0g×231包 [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号