

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	16100AMZ03620000
販売開始	1986年11月

劇薬

漢方製剤

三和真武湯エキス細粒

シンブトウ

貯法：室温保存
有効期間：3年

E K - 3 0

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	三和真武湯エキス細粒
有効成分	本品1日量（4.5g）中 日局ブクリョウ 5.0g 日局ビャクジュツ3.0g 日局シャクヤク 3.0g 日局ブシ 1.0g 日局ショウキョウ1.0g 上記の混合生薬より抽出した日局真武湯エキス 2,400mgを含有する。
添加剤	日局乳糖水和物、日局トウモロコシデンプン、 日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、部 分アルファー化デンプン

3.2 製剤の性状

剤形	細粒
色	褐色
におい	特異な芳香
味	苦い
識別コード	EK-30

4. 効能又は効果

新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢しやすく動悸やめまいを伴うものの次の諸症

胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎

6. 用法及び用量

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.1.2 暑がりで、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるブシの副作用があらわれやすくなる。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

慎重に投与すること。本剤にはブシが含まれている。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、痒疹、蕁麻疹等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

1.5g×42包 [分包]

1.5g×294包 [分包]

500g [ボトル]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

〈文献請求先〉

クラシエ薬品株式会社 医薬学術統括部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03 (5446) 3352 FAX 03 (5446) 3371

〈製品情報お問合せ先〉

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03 (5446) 3334 FAX 03 (5446) 3374

〈受付時間〉10:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日を除く）

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **三和生薬株式会社**

栃木県宇都宮市平出工業団地6番地1（郵便番号321-0905）

26.2 発売元

クラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20（郵便番号 108-8080）