

貯 法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16000AMZ05465000

販売開始 1955年9月

皮膚軟化剤

日本薬局方 グリセリンカリ液

グリセリンカリ液「東豊」

Glycerin and Potash Solution

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1000mL 中 日局水酸化カリウム 3g 日局グリセリン 200mL
添加剤	エタノール、香料

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液で、芳香がある。
----	----------------

4. 効能又は効果

手足の亀裂性・落屑性皮膚炎

6. 用法及び用量

通常、1日1～数回適量を患部に塗布する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
皮膚	刺激感、発赤

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 粘膜には使用しないこと。

14.1.2 連用により、皮膚が刺激に対して弱くなることがあるので、長期連用を避けること。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

水酸化カリウムは皮膚の角質を軟化し、グリセリンは皮膚軟化及び乾燥防止作用により、皮膚の亀裂に対し効果がある。しかし、連用により少しの刺激にも侵されやすくなる¹⁾ことがある。

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 水酸化カリウム

一般的名称：水酸化カリウム (Potassium Hydroxide)

化学名：Potassium Hydroxide

化学式：KOH

式量：56.11

性状：日本薬局方水酸化カリウムは水酸化カリウム (KOH) 85.0%以上を含む。

本品は白色の小球状、薄片状、棒状又はその他の塊で、堅く、もろく、断片は結晶性である。本品は水又はエタノール (95) に溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は空气中で速やかに二酸化炭素を吸収する。本品は湿気によって潮解する。

19.2 グリセリン


一般的名称：グリセリン (Glycerin)

化学名：Propane-1, 2, 3-triol

分子式：C₃H₈O₃

分子量：92.09

化学構造式：



性状：無色澄明の粘性の液である。水又はエタノール (99.5) と混和する。吸湿性である。

比重 d_{20}^{20} ： 1.26331(100%)

22. 包装

500mL (ガラス瓶)

23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書：廣川書店，2021：C-1632

24. 文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 学術部

〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10

電話 03-3381-2004

FAX 03-3381-7728

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

東豊薬品株式会社

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 4-15-3

26.2 発売元

吉田製薬株式会社

〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10