

ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

ビタミンC・パントテン酸カルシウム顆粒

シーピー配合顆粒

CP COMBINATION GRANULES

貯 法：室温保存
有効期間：3年

承認番号	22100AMX01800
販売開始	1985年11月

3. 組成・性状

3.1 組成

1g中の有効成分	日局 アスコルビン酸	200mg
	日局 パントテン酸カルシウム	3mg
添加剤	白糖、水酸化マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色三酸化鉄	

3.2 製剤の性状

性状・剤形	黄色の顆粒剤であり、1包1gの分包品もある。
-------	------------------------

4. 効能又は効果

本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）、炎症後の色素沈着
効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

6. 用法及び用量

通常成人1回1～3gを1日1～3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器	胃不快感、悪心・嘔吐、下痢等

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

12.1 アスコルビン酸（ビタミンC）により、各種の尿検査で、尿糖の検出を妨害することがある。

12.2 アスコルビン酸（ビタミンC）により、各種の尿試験紙法による尿検査（潜血、ビリルビン、亜硝酸塩）・便潜血反応検査で、偽陰性を呈することがある¹⁾。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意


14.1.1 アルカリ性薬剤、吸湿性薬剤との配合は避けること。

14.1.2 配合時の粉碎は避けること。

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 アスコルビン酸

構造式：



一般名：アスコルビン酸（Ascorbic Acid）

化学名：L-threo-Hex-2-enono-1,4-lactone

分子式：C₆H₈O₆


分子量：176.12

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、酸味がある。水に溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

融 点：約190℃（分解）

19.2 パントテン酸カルシウム

構造式：



一般名：パントテン酸カルシウム（Calcium Pantothenate）

化学名：Monocalcium bis{3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoylamino]propanoate}

分子式：C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀

分子量：476.53

性状：白色の粉末である。水に溶けやすく、エタノール（99.5）にほとんど溶けない。1.0gを水20mLに溶かした液のpHは7.0～9.0である。吸湿性である。結晶多型が認められる。

20. 取扱い上の注意

アルミ袋開封後は湿気を避けて遮光して保存すること。

22. 包装

1g×1050包 [分包]

1kg [500g×2袋：バラ]

23. 主要文献

1) 伊藤機一ほか：臨床と薬物治療. 1992；11：202-211

24. 文献請求先及び問い合わせ先

東和薬品株式会社 学術部DIセンター

〒570-0081 大阪府守口市日吉町2丁目5番15号

☎0120-108-932 FAX 06-7177-7379

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号