

貯 法： 遮光し、室温保存

有効期間： 3年

承認番号 23A2X00053

販売開始 1991年12月

その他の滋養強壮薬  
日本薬局方 ブドウ酒  
Wine

**2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)**

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]

**3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	ブドウ酒		
有効成分	1mL中	ブドウ酒 (日局)	1mL

**3.2 製剤の性状**

販売名	ブドウ酒
性状	帯赤紫色～赤紫色の液で、特異な芳香があり、味は僅かに渋く、やや刺激性である。 比重 $d_{20}^{20}$ ：0.990～1.010

**4. 効能又は効果**

- 食欲増進、強壮、興奮
- 下痢
- 不眠症
- 無塩食事療法

**6. 用法及び用量**

通常、成人1回1食匙（15mL）又は1酒杯（60mL）を経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

また、リモナー剤や滴剤の佐薬にも用いる。

**8. 重要な基本的注意**

- 本剤はアルコール製剤であるため、投与に際しては、注意すること。
- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないよう十分に注意すること。

**9. 特定の背景を有する患者に関する注意****9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望ましい。

**9.6 授乳婦**

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

**9.7 小児等**

投与しないこと。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。アルコールにより副作用等を起こすおそれがある。

**9.8 高齢者**

減量するなど注意すること。一般に、生理機能が低下している。

**10. 相互作用****10.1 併用禁忌 (併用しないこと)**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム (ノックピン) シアナミド (シアナマイド) カルモフル プロカルバジン塩酸塩 [2.参照]	これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等) を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

**10.2 併用注意 (併用に注意すること)**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシセフナトリウム、メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等) を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

・本剤はアルコールを含有するので、他の薬剤の作用を増強又は減弱するおそれがある。

**18. 薬効薬理****18.1 作用機序**

生体に対する主作用は含有するアルコールによるものと考えられる<sup>1)</sup>。

**19. 有効成分に関する理化学的知見**

一般的名称： ブドウ酒 (Wine)

性状： ブドウ *Vitis vinifera* Linné (*Vitaceae*) 又はその他の品変種の果実を発酵して得た果実酒である。エタノール11.0～14.0vol%及び酒石酸0.10～0.40w/v%を含む。

酸化防止剤としてピロ亜硫酸カリウムを含む。  
合成甘味料及び合成着色料を含まない。

## 20. 取扱い上の注意

なるべく涼しい所に保管して下さい。

## 22. 包装

500mL（ガラス容器）

## 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店, 2021 : C-4708

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1  
TEL 0567-32-1431  
FAX 0567-32-2961

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元



**中北薬品株式会社**  
愛知県津島市白浜町字番場52-1