

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

## 気道潤滑去痰剤

アンブロキソール塩酸塩錠

# アンブ"ロキソール 塩酸塩錠 15mg「アメル」

Ambroxol Hydrochloride Tablets 「AMEL」

承認番号	22700AMX00121
販売開始	1992年7月


**2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**  
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「アメル」
有効成分	1錠中、アンブロキソール塩酸塩 15.0mg を含有する。
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

#### 3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「アメル」	割線入り素錠 白色	 直径：約 6.0mm 厚さ：約 2.1mm 質量：約 80.0mg	KW262

### 4. 効能又は効果

#### ○下記疾患の去痰

急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難

#### ○慢性副鼻腔炎の排膿

### 6. 用法及び用量

通常、成人には、1回1錠（アンブロキソール塩酸塩として15.0mg）を1日3回経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。

#### 9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.1 重大な副作用

##### 11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

発疹、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下等があらわれることがある。

#### 11.1.2 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）

#### 11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
消化器	胃不快感	胃痛、腹部膨満感、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、便秘、食思不振、消化不良（胃部膨満感、胸やけ等）	
過敏症		発疹、蕁麻疹、蕁麻疹様紅斑、そう痒	血管浮腫（顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等）
肝臓		肝機能障害（AST 上昇、ALT 上昇等）	
その他		口内しびれ感、上肢のしびれ感	めまい

注）発現頻度は錠、液、シロップ及び徐放カプセルの承認時までの臨床試験及び使用成績調査を含む。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度


##### 16.1.1 生物学的同等性試験

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「アメル」とムコソルバン錠 15mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アンブロキソール塩酸塩として 15mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中アンブロキソール濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>1)</sup>。

薬物動態パラメータ（生物学的同等性）

	AUC <sub>(0→13)</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「アメル」	221.190 ± 70.959	34.43 ± 10.58	2.1 ± 0.6	4.09 ± 0.45
ムコソルバン錠 15mg	228.750 ± 67.594	34.57 ± 6.43	2.2 ± 0.6	4.81 ± 0.95

(Mean ± S.D., n = 10)



血漿中アンブロキシソール濃度（生物学的同等性）  
 血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

**18. 薬効薬理**

**18.1 作用機序**

アンブロキシソール塩酸塩は、気管・気管支領域において、肺表面活性物質の分泌促進作用、気道液の分泌促進作用、線毛運動亢進作用が総合的に作用して喀痰喀出効果を示すものと考えられる。この際、肺表面活性物質の役割としては、線毛の存在しない肺胞や呼吸細気管支を含め気道中の粘性物質を排出しやすくするものと考えられている<sup>2)-6)</sup>。  
 また、副鼻腔領域においては、病的副鼻腔分泌の正常化作用、線毛運動亢進作用が総合的に作用して慢性副鼻腔炎の排膿を促進するものと考えられる<sup>7),8)</sup>。

**19. 有効成分に関する理化学的知見**

**一般名**

アンブロキシソール塩酸塩 (Ambroxol Hydrochloride)

**化学名**

*trans*-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride

**分子式**

C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O · HCl


**分子量**

414.56

**性状**

白色の結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。  
 メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール (99.5) にやや溶けにくく、酢酸 (100) に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。  
 融点：約 235℃ (分解)。

**構造式**



**22. 包装**

- 100 錠 [10 錠 (PTP) × 10]
- 1,000 錠 [10 錠 (PTP) × 100]
- 1,000 錠 [瓶、バラ]

**23. 主要文献**

- 1) 社内資料：生物学的同等性試験 [錠 15mg]
- 2) 長岡滋, 他：薬理と治療. 1981；9 (5)：1845-1854
- 3) 千田勝一, 他：薬理と治療. 1981；9 (2)：483-486
- 4) 前多治雄, 他：薬理と治療. 1981；9 (2)：487-490
- 5) Curti PC. : Pneumonologie. 1972；147 (1)：62-74
- 6) Curti PC, et al. : Arzneim-Forsch. 1978；28 (5a)：922-925
- 7) 金春順, 他：薬理と治療. 1991；19 (6)：2151-2158
- 8) 大橋淑宏, 他：薬理と治療. 1991；19 (6)：2159-2167

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口  
 〒 530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4  
 ☎ 0120-041-189  
 FAX 06-6121-2858

**26. 製造販売業者等**

**26.1 製造販売元**

**共和薬品工業株式会社**  
 大阪市北区中之島 3-2-4