

2023年8月改訂（第1版）

外用局所収れん剤

劇薬

山 善 酢 酸 鉛  
(鉛 糖)

貯法：室温保存

有効期間：3年

規制区分：劇薬

日本標準商品分類番号	
872644	
承認番号	15200AMZ00730
販売開始	1977年8月

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

有効成分	1g中 酢酸鉛 ( $C_2H_3O_2Pb \cdot 3H_2O$ ) 1g含有
------	--

#### 3.2 製剤の性状

性状	光沢のある無色の結晶又は白色の結晶の塊で、わずかに酢酸のにおいがある。
----	-------------------------------------

### 4. 効能又は効果

表皮に欠損のない打撲

### 6. 用法及び用量

通常、1～2%の水溶液を湿布剤として使用する。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	
長期・大量使用	鉛中毒

### 13. 過量投与

#### 13.1 長期・大量使用

大量に吸収された場合には、鉛中毒を起こすことが報告されている。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 本剤は空气中で風解しやすく、炭酸ガスを吸収して水に透明に溶けなくなるので、使用前、速やかに密栓する等、取り扱いに注意すること。

14.1.2 本剤は水溶液中で、塩素イオン、炭酸イオンと反応して白濁を生じる。とくに本剤の水溶液を調製する場合は煮沸するなどして二酸化炭素を除いた精製水を使用して用時調製すること。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

タンパク質と結合して、タンパク鉛を生成し、収れん作用を現わす。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：酢酸鉛 (Lead Acetate)

分子式： $C_2H_3O_2Pb \cdot 3H_2O$

分子量：379.33

性状：光沢のある無色の結晶又は白色の結晶の塊で、わずかに酢酸のにおいがある。

### 22. 包装

500g (ガラス瓶)

23. 主要文献

第八改正日本薬局方解説書 廣川書店

24. 文献請求先及び問い合わせ先

山善製薬株式会社 学術室

〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

TEL06-6231-1821 FAX06-6231-1824

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号